

ANAFILAKSJA



ZADZWOŃ

112 LUB 999

Jeżeli po posiłku,
podaniu leku, użądleniu
gwałtownie pojawią się...

- Pokrzywka
- Silny świąd całego ciała
- Napad kaszlu
- Obrzęk w gardle
- Obrzęk języka
- Świszczący oddech
- Brak kontaktu
- Utrata świadomości

Jeżeli dziecko
ma przy sobie
ADRENALINĘ -
podaj mu
domięśniowo i wezwij
**POGOTOWIE
RATUNKOWE**

Wezwij
pomoc



Połóż **DZIECKO**
i podnieś jego nogi
ku górze

POMÓŻ
MOŻESZ URATOWAĆ
LUDZKIE ŻYCIE



ADRENALINA



We **WSTRZYKIWACZU**



W **AMPULKOSTRZYKAWCE**

- Chwyć wstrzykiwacz, aby dłoń była zaciśnięta wokół wstrzykiwacza z pomarańczową końcówką skierowaną w dół.
- Drugą ręką zdejmij niebieską końcówkę.
- Trzymaj końcówkę ok. 10 cm od uda i przez ubranie uderz mocno w udo.
- Przytrzymaj wstrzykiwacz 5 s przy udzie, następnie odciągnij na bok.
- Podaj całą dawkę zawartą we wstrzykiwaczu.


- Zdejmij nasadkę igły.
- Nie zdejmuj blokady na tłoku.
- Wbij igłę w udo.
- Nie podawaj przez ubranie.
- Naciśnij tłok, aż poczujesz opór.
- Wyjmij igłę.
- Rozmasuj miejsce wstrzyknięcia.
- Podaj całą zawartość ampułkostrzykawki.

PRZEDNIO - BOCZNA
POWIERZCHNIA


UDA

w jego
1/3

GÓRNEJ CZĘŚCI



W apteczce szkolnej,
w miejscu łatwo dostępnym
powinny znajdować się
2 - 4 zestawy **ADRENALINY**
w postaci autostrzykiwaczy
lub ampułkostrzykawek



www.pta.med.pl